



Sociedade Brasileira de Medicina
de Família & Comunidade

EDITAL SBMFC TEMFC Nº 11

EXAME DE SUFICIÊNCIA PARA OBTENÇÃO DE TÍTULO DE ESPECIALISTA EM MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE (TEMFC) PROVA ESCRITA

Nome do Candidato

Número de Inscrição

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- O candidato receberá do fiscal:

Um Caderno de Questões contendo **80 (oitenta)** questões objetivas de múltipla escolha.

Uma Folha de Respostas personalizada para a Prova Objetiva.

- Ao ser autorizado o início da prova, verifique, no Caderno de Questões, se a numeração das questões e a paginação estão corretas. Caso contrário, solicite ao fiscal um outro caderno completo. Não serão aceitas reclamações posteriores.

- O candidato terá **4 (quatro) horas** para a realização da prova, incluindo o tempo para o preenchimento da Folha de Respostas.

- O candidato poderá retirar-se da sala de prova após **1 (uma) hora** do início da prova, entregando sua Folha de Respostas e o Caderno de Questões ao fiscal.

- O candidato somente poderá retirar-se do local de realização da prova levando o Caderno de Questões, que é de preenchimento facultativo, após decorridas **2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos** do início da aplicação da prova.

- Caso seja necessária a utilização do sanitário, o candidato deverá solicitar permissão ao fiscal de sala que designará um fiscal volante para acompanhá-lo no deslocamento, devendo manter-se em silêncio durante todo o percurso, podendo, antes e depois da entrada no sanitário, sofrer revista através de detector de metais.

- Ao término da prova, após a saída da sala de provas, não será permitida a permanência do candidato nas dependências do colégio. Não será permitida, nem mesmo, a utilização dos sanitários.

ATENÇÃO

- Verifique se seus dados estão corretos na Folha de Respostas.

- Assinale a alternativa que julgar correta para cada questão na Folha de Respostas, usando caneta esferográfica de tinta preta ou azul. Para cada questão, existe apenas 1 (uma) resposta certa – mais de uma letra assinalada implicará anulação da questão.

- Qualquer rasura no preenchimento anulará a questão. Portanto, a Folha de Respostas **NÃO** pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.

- O modo correto de assinalar a alternativa é cobrindo, fortemente, o espaço a ela correspondente, conforme modelo abaixo:

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------

- Todas as questões deverão ser respondidas.

OS TEXTOS E AS QUESTÕES FORAM REDIGIDOS CONFORME O NOVO ACORDO ORTOGRÁFICO DA LÍNGUA PORTUGUESA, MAS ESTE NÃO SERÁ COBRADO NO CONTEÚDO.

12/2010



CONCURSOS PÚBLICOS
CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO

Espaço reservado para anotação das respostas

EXAME DE SUFICIÊNCIA PARA OBTENÇÃO DE TÍTULO DE ESPECIALISTA EM MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE (TEMFC) – PROVA ESCRITA



CONCURSOS PÚBLICOS
CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO

Nome: _____

Inscrição: _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80

<p>1. Lactente de 2 meses é levada pela mãe à consulta por apresentar pequeno abscesso subcutâneo com 1,1cm de diâmetro no local da aplicação da vacina BCG feita previamente. A lesão é indolor e não há outras manifestações inflamatórias ou presença de linfadenopatia. Sobre essa situação, são feitas as seguintes afirmações:</p> <p>I. a formação do abscesso provavelmente deveu-se a erro de técnica de administração da BCG, com aplicação subcutânea.</p> <p>II. a conduta adequada inclui o uso de isoniazida via oral até a regressão completa da lesão.</p> <p>III. pode ocorrer fistulização da lesão.</p> <p>É correto o que se apresenta em</p> <p>(A) I, apenas. (B) II, apenas. (C) I e II, apenas. (D) I e III, apenas. (E) I, II e III.</p>	<p>4. Um senhor de 71 anos procura o Médico de Família e Comunidade porque apresentou palpitação de início súbito na noite anterior. A ausculta cardíaca revela um ritmo irregular e uma frequência de 120 batimentos por minuto, compatível com fibrilação atrial. O paciente é hipertenso e vinha apresentando um controle adequado da pressão arterial com o uso de hidroclorotiazida 25mg uma vez ao dia e captopril 25mg duas vezes ao dia. Entre as alternativas abaixo, assinale a que apresenta a melhor conduta para este caso.</p> <p>(A) Substituir captopril por propranolol. (B) Prescrever varfarina. (C) Encaminhar o paciente para a emergência a fim de que se avalie a possibilidade de cardioversão. (D) Prescrever digoxina. (E) Adotar conduta expectante, reavaliando o paciente em 7 dias.</p>
<p>2. Em relação aos problemas auditivos, analise as assertivas abaixo.</p> <p>I. Presbiacusia é a deterioração simétrica e progressiva da audição, que piora com a idade, para sons de alta frequência.</p> <p>II. Perda auditiva associada à exposição sonora é a causa prevenível mais comum de surdez neurossensorial.</p> <p>III. Doença de Menière está associada à perda auditiva variável, a zumbido e à vertigem.</p> <p>É correto o que se afirma em</p> <p>(A) I, apenas. (B) II, apenas. (C) III, apenas. (D) I e II, apenas. (E) I, II e III.</p>	<p>5. Em relação ao manejo de problemas oculares, correlacione as colunas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.</p> <p>() Trauma corneano. () Glaucoma agudo. () Conjuntivite bacteriana. () Iridociclite. () Conjuntivite alérgica.</p> <p>1. Colírio de antibiótico. 2. Colírio de pilocarpina. 3. Colírio de atropina. 4. Colírio com vasoconstritores tópicos. 5. Colírio anestésico.</p> <p>(A) 1/ 3/ 2/ 4/ 5 (B) 5/ 2/ 1/ 3/ 4 (C) 5/ 3/ 4/ 1/ 2 (D) 4/ 2/ 5/ 3/ 1 (E) 1/ 4/ 5/ 2/ 3</p>
<p>3. São contraindicações para realização de atividades físicas durante a gestação, exceto uma. Assinale-a.</p> <p>(A) Pré-eclâmpsia. (B) Persistência de sangramento no segundo ou terceiro trimestre. (C) Gestação múltipla. (D) Gestante com baixo peso. (E) Incompetência de cérvix.</p>	<p>6. Homem de 32 anos, garçom, sofreu um corte na mão, durante a sua jornada de trabalho, num pequeno restaurante próximo à Unidade Básica de Saúde. Ao avaliar o ferimento, o Médico decide realizar a sutura da lesão e indica afastamento do trabalho. A Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), nessa situação, poderia ser emitida pelos seguintes profissionais:</p> <p>I. Médico da Unidade Básica de Saúde. II. Médico da empresa. III. Médico de serviço privado.</p> <p>É correto o que se apresenta em</p> <p>(A) I, apenas. (B) II, apenas. (C) III, apenas. (D) I e II, apenas. (E) I, II e III.</p>

7. Em relação à constipação intestinal no lactente e no recém-nascido, assinale a alternativa **incorreta**.

- (A) O óleo mineral não deve ser usado em crianças com refluxo gastroesofágico.
- (B) Geralmente, períodos de um ou mais dias sem evacuar, em crianças em aleitamento materno, estão relacionados à redução do volume de leite materno ingerido.
- (C) Crianças em aleitamento materno, com fezes endurecidas, volumosas e com distensão abdominal, não precisam de maior investigação.
- (D) O toque retal faz parte do exame físico da criança com constipação e tem a finalidade de sentir a presença de fezes na ampola retal e estenose.
- (E) A ausência de fezes na ampola retal sugere Doença de Hirschprung.

8. Em relação ao manejo da cardiopatia isquêmica, marque V para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () Programas de atividade física não reduzem mortalidade total.
 - () Dietas do tipo oriental estão relacionadas à redução de eventos cardiovasculares.
 - () Os betabloqueadores reduzem o risco para mortalidade coronariana e total em pacientes com infarto prévio.
 - () Os bloqueadores de cálcio podem ser utilizados no tratamento e na prevenção do espasmo coronariano, mas não são indicados na angina de limiar fixo.
- (A) V/ F/ V/ F
(B) F/ V/ F/ V
(C) F/ F/ V/ F
(D) V/ V/ F/ F
(E) F/ F/ V/ V

9. Em relação à insônia, é **incorreto** afirmar que

- (A) os pacientes com insônia crônica frequentemente queixam-se de sonolência excessiva, fadiga, dificuldade de concentração, falta de memória, dores musculares e depressão.
- (B) algumas drogas frequentemente relacionadas à insônia são: antidepressivos, esteroides, descongestionantes e betabloqueadores.
- (C) a dependência de álcool pode ser evidenciada em sua primeira manifestação pela queixa de dificuldade de manter o sono.
- (D) uma alternativa para os benzodiazepínicos é o uso de agonistas de receptores de benzodiazepínicos de meia-vida curta, como zolpiden ou sedativos anti-histamínicos como a difenidramina.
- (E) o uso de antidepressivos inibidores da recaptção da serotonina devem ser indicados mesmo em pacientes sem depressão.

10. Um adolescente de 18 anos comparece à consulta com queixa de acne. Apresenta comedões, pápulas, pústulas e seborreia, sem outras alterações. Nesse caso, pode(m) ser prescrito(s)

- I. peróxido de benzoíla tópico.
- II. eritromicina tópico.
- III. doxiciclina via oral, se necessário.

É correto o que se apresenta em

- (A) I, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) I, II e III.
- (E) III, apenas.

11. Uma mulher de 69 anos é acompanhada na Unidade Básica de Saúde, há vários anos, para tratamento de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), comprovada por espirometria. Na consulta atual, ela informa um aumento na quantidade de escarro, mudança na sua coloração, que passou a ficar amarelada e piora da tosse e da falta de ar. A partir dessa situação, analise as proposições abaixo.

- I. O diagnóstico de exacerbação da DPOC pode ser feito clinicamente.
- II. Não há indicação do uso de corticoide via oral.
- III. Deve ser prescrito um antibiótico.

É correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) I e II, apenas.
- (E) I e III, apenas.

12. Na busca de respostas a dúvidas cotidianas, o Médico de Família e Comunidade deverá conhecer os diferentes delineamentos de estudos científicos e saber quando um estudo tem o delineamento adequado para responder à sua dúvida. Correlacione as colunas referentes ao objetivo do estudo e ao melhor delineamento de estudo e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

1. Avaliar se o desenvolvimento de câncer de esôfago ou de boca **se associa** ao hábito passado de alguns pacientes de tomar chá com água quente, superior à temperatura de 80°C.
2. Avaliar, em pacientes idosos com anemia, qual o **exame diagnóstico** – ferritina ou transferrina – com melhor valor preditivo para definir se a anemia é de origem ferropriva.
3. Avaliar o **risco cardiovascular (prognóstico)** de um homem de 40 anos, com diabetes, tabagista, pressão arterial de 162/98mmHg, colesterol total de 260 e HDL de 30.
4. Estudar a **associação** entre a cobertura populacional, pela Estratégia Saúde da Família, com a incidência de dengue em municípios do Rio de Janeiro ao longo de 1 ano.
5. Decidir qual o melhor fármaco para iniciar o **tratamento** do diabetes tipo 2 em paciente obeso.

- I. Ensaio Clínico Randomizado.
- II. Estudo Transversal.
- III. Estudo Ecológico.
- IV. Estudo de Coorte.
- V. Estudo de Casos e Controles.

- (A) 1 – III; 2 – IV; 3 – II; 4 – V; 5 – I
(B) 1 – V; 2 – II; 3 – I; 4 – IV; 5 – III
(C) 1 – V; 2 – II; 3 – IV; 4 – III; 5 – I
(D) 1 – II; 2 – IV; 3 – I; 4 – III; 5 – V
(E) 1 – I; 2 – III; 3 – IV; 4 – II; 5 – V

13. Criança de 4 meses apresenta exantema eritematoso oleoso em região retroauricular, região pré-esternal, face e com crostas em couro cabeludo. O diagnóstico mais provável é de

- (A) impetigo.
- (B) dermatite atópica.
- (C) dermatite seborreica.
- (D) escabiose.
- (E) miliária.

14. Em relação à osteoporose, marque V para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () O Raio X tem baixa sensibilidade para a sua avaliação, sendo indicado para avaliar fraturas.
() O rastreamento de todos os pacientes assintomáticos não é recomendado.
() Exercícios com peso (musculação) não aumentam a massa óssea.
() Indivíduos que usam corticoides por mais de 3 meses devem iniciar suplementação com cálcio e vitamina D.
() A terapia de reposição hormonal isolada deve ser utilizada como primeira escolha em mulheres que não apresentaram fraturas.
() Os bisfosfonados devem ser utilizados com suplementação de cálcio e vitamina D.
- (A) V/ V/ V/ V/ F/ V
(B) V/ V/ F/ V/ F/ V
(C) F/ F/ F/ F/ F/ V
(D) F/ V/ F/ F/ V/ F
(E) V/ F/ V/ F/ F/ F

15. Paciente idoso, com 79 anos, comparece à consulta para um “check-up”. Durante a anamnese, o paciente relatou 3 episódios de queda no último ano. Como parte da avaliação, assinale a alternativa que apresenta o que **não** deve ser realizado.

- (A) Teste de marcha e equilíbrio.
- (B) Identificação de possíveis arritmias cardíacas.
- (C) Avaliação da pressão arterial com o paciente somente sentado.
- (D) Revisão de medicações em uso, com especial atenção a psicofármacos.
- (E) Exame de visão.

16. São recomendações gerais para prevenção de quedas em pacientes que vivem na comunidade, **exceto** uma. Assinale-a.

- (A) Treinar marcha com eventual utilização de objetos auxiliares, como bengalas e andadores.
- (B) Realizar programas de exercício para o equilíbrio.
- (C) Modificar fatores ambientais que colocam o paciente em risco, como tapetes soltos, fios elétricos no trajeto, escadas com degraus mal-demarcados.
- (D) Suspender anti-hipertensivos em pacientes com risco cardiovascular inferior a 20% pelo risco de hipotensão postural.
- (E) Correção de problemas visuais e da iluminação ambiental.

17. Homem de 25 anos comparece à consulta, referindo blenorragia e disúria. Ao exame físico, constata-se que não há úlceras e há corrimento uretral apenas com ordenha pelo paciente. Assinale a alternativa que apresenta a melhor conduta frente a este quadro de Doença Sexualmente Transmissível (DST).

- (A) Tratamento sintomático concomitante de uretrite por gonococo ou clamídia com ampicilina 500mg em dose única e azitromicina 500mg de 12 em 12 horas por 7 dias.
- (B) Tratamento sintomático de uretrite por gonococo e clamídia; encorajar o paciente a comunicar todas(os) as(os) parceiras(os) para consulta e tratamento; aconselhamento para realização de testes sorológicos de DSTs e prevenção futura com orientação de sexo seguro, além da notificação do caso.
- (C) Tratamento sintomático para *Trichomonas vaginalis* com metronidazol 400mg a cada 12 horas por 7 dias, para paciente e parceira, e aconselhamento para evitar relações sexuais durante o tratamento.
- (D) Tratamento apenas de gonococo se houver baciloscopia com presença de diplococos gram-negativos, com ceftriaxona 125mg, intramuscular em dose única.
- (E) Como o corrimento só apareceu com a ordenha (baixa densidade de diplococos), deve-se encaminhar o paciente para um centro secundário de tratamento onde será realizado um estudo microbiológico, evitando-se riscos de resistência bacteriana em tratamento empírico.

18. Em relação às vulvovaginites, assinale a alternativa correta.

- (A) A candidíase apresenta secreção vaginal esbranquiçada e grumosa e pode se manifestar por disúria relacionada à irritação da pele lesada em contato com a urina, quando está indicada a cultura de fungos.
- (B) A tricomoníase caracteriza-se por prurido intenso, edema de vulva, secreção vaginal amarelo-esverdeada bolhosa, presença de protozoário móvel em exame a fresco e o tratamento de escolha deve ser realizado com metronidazol gel 0,75%, intravaginal, por 7 dias.
- (C) Nos casos de candidíase recorrente, definida por 4 ou mais episódios em um ano, deve-se investigar diabetes, avaliar uso frequente de antibióticos ou imunossupressão.
- (D) A vaginose bacteriana não deve ser tratada, em nenhuma circunstância, quando a paciente for assintomática, pelo risco de o tratamento desencadear desequilíbrio da flora, além do risco de reações adversas ao próprio fármaco.
- (E) Embora os riscos de trabalho de parto prematuro ou ruptura de membranas estejam relacionados à vaginose e à tricomoníase vaginal na gestação, o risco de teratogenicidade contraindica o uso de metronidazol, utilizando tratamento indicado com tinidazol 2g em dose única.

19. Puérpera de 20 dias comparece à consulta, referindo dor na mama direita há 5 dias, e apresentando febre e calafrios desde a véspera. Sobre complicações da amamentação, é **incorreto** afirmar que

- (A) na mastite, a parte afetada está dolorosa, hiperemiada, edemaciada e quente, podendo haver febre e comprometimento do estado geral, especialmente quando há infecção.
- (B) a amamentação deve ser mantida na mastite, pois não oferece riscos ao recém-nascido a termo sadio.
- (C) o tratamento desta paciente deve incluir antibiótico com cobertura antiestafilocócica (amoxicilina, cefalexina, eritromicina, entre outros) por 10 a 14 dias e deve ser iniciado precocemente.
- (D) a possibilidade de abscesso mamário deve ser considerada quando não há melhora em 48 horas.
- (E) no caso de abscesso mamário, a amamentação deve ser interrompida em ambas as mamas até a resolução do caso.

20. Associe as condições com o local/ profissional mais adequado para o tratamento da depressão e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- 1. Estado delirante agitado.
 - 2. Diagnóstico de depressão bem estabelecido.
 - 3. Primeiro episódio de depressão com sintomas leves ou moderados.
 - 4. Paciente prefere ser tratado pelo seu Médico.
 - 5. Estupor profundo, problemas de alimentação e desidratação.
 - 6. Doenças ou tratamentos concomitantes que podem ter como contraindicação o uso de antidepressivo.
- I. Tratamento pelo Médico de Família e Comunidade no serviço de Atenção Primária à Saúde.
 - II. Encaminhamento para psiquiatra e equipe de saúde mental em ambulatório de nível secundário.
 - III. Tratamento em internação hospitalar.
- (A) 1 – II; 2 – I; 3 – II; 4 – II; 5 – III; 6 – III
 - (B) 1 – III; 2 – I; 3 – I; 4 – I; 5 – III; 6 – II
 - (C) 1 – II; 2 – II; 3 – III; 4 – I; 5 – III; 6 – III
 - (D) 1 – III; 2 – II; 3 – I; 4 – I; 5 – II; 6 – III
 - (E) 1 – III; 2 – III; 3 – I; 4 – II; 5 – II; 6 – II

21. Paciente de 39 anos, G2P2, tabagista (20 cigarros/dia), com história prévia de enxaqueca sem aura, comparece à Unidade Básica de Saúde, buscando anticoncepcional. Faz uso regular de preservativos, mas refere insegurança com método único. Sendo assim, assinale a alternativa que apresenta o método anticoncepcional que está **contraindicado** para essa paciente.

- (A) DIU.
- (B) Minipílula.
- (C) Medroxiprogesterona trimestral.
- (D) Anticoncepcional oral combinado.
- (E) Implante subdérmico.

Leia o caso clínico abaixo para responder às questões 22, 23 e 24.

Paciente de 42 anos, masculino, com diagnóstico de *Diabetes mellitus* tipo 2 há 3 anos, comparece à Unidade Básica de Saúde para mostrar exames de controle. Há 6 meses iniciou tratamento com mudanças no estilo de vida e há 15 dias apresentou crise de gota. Ao exame, PA = 190/120mmHg, cintura abdominal = 115cm e IMC = 34kg/m². Exames cardiovascular e pulmonar normais. Está assintomático. Seus exames mostram HbA1c = 7,8%, glicemia = 210mg/dL, colesterol total = 289mg/dL, HDL = 32mg/dL, triglicerídios = 339mg/dL, microalbuminúria em amostra = 67mg/L, creatinina = 1,1mg/dL e ácido úrico = 13mg/dL.

22. Em relação ao diabetes desse paciente, assinale a alternativa que apresenta a conduta mais adequada.

- (A) Observar.
- (B) Reforçar dieta por 6 meses.
- (C) Iniciar insulina.
- (D) Iniciar metformina.
- (E) Iniciar glibenclamida.

23. Em relação à pressão arterial desse paciente, assinale a alternativa que apresenta a conduta mais adequada.

- (A) Observar.
- (B) Controlar a pressão por 1 mês.
- (C) Iniciar diurético tiazídico.
- (D) Iniciar inibidor da Enzima Conversora da Angiotensina.
- (E) Iniciar betabloqueador.

24. Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, as metas de controle de hemoglobina glicada, pressão arterial e LDL para esse paciente.

- (A) < 7%; < 140/90mmHg; < 130mg/dL.
- (B) < 7%; < 130/80mmHg; < 100mg/dL.
- (C) < 6,5%; < 140/90mmHg; < 130mg/dL.
- (D) < 6,5%; < 130/80mmHg; < 100mg/dL.
- (E) < 6%; < 130/85mmHg; < 100mg/dL.

25. Homem de 29 anos comparece à Unidade Básica de Saúde pela primeira vez com lesão ulcerada no pênis, única, não dolorosa há 5 dias. É casado e não faz uso de preservativos. Assinale a alternativa que apresenta a conduta mais adequada para esse paciente.

- (A) Solicitar VDRL e FTA-Abs.
- (B) Tratar sífilis e cancro mole.
- (C) Tratar herpes genital.
- (D) Tratar clamídia e gonococo.
- (E) Tratar donovanose.

26. Mulher de 35 anos, previamente hígida, comparece à consulta na Unidade Básica de Saúde com queixa de pirose relacionada à alimentação e episódios de regurgitação há um mês. Nega história familiar de câncer, perda de peso e sangramento digestivo. Assinale a alternativa que apresenta a conduta inicial de melhor custo-efetividade para essa paciente.

- (A) Solicitar endoscopia digestiva alta.
- (B) Prescrever pró-cinético.
- (C) Prescrever antiácidos.
- (D) Prescrever inibidores da bomba de prótons.
- (E) Tratar *Helicobacter pylori*.

27. Em relação aos marcadores sorológicos da Hepatite B (HBV), correlacione as colunas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

1. HBsAg.
2. Anti-HBc IgM.
3. HBeAg.
4. Anti-HBs.

() É o primeiro marcador que aparece no curso da infecção pelo HBV.

() É marcador de infecção recente, encontrado no soro até 6 meses após a infecção.

() É marcador de replicação viral.

() Está presente isoladamente em pessoas vacinadas.

- (A) 3/ 4/ 1/ 2
- (B) 1/ 3/ 2/ 4
- (C) 2/ 3/ 4/ 1
- (D) 2/ 1/ 4/ 3
- (E) 1/ 2/ 3/ 4

28. Sobre a decisão diagnóstica e as propriedades de exames complementares, assinale a alternativa **incorreta**.

- (A) Quando se quer excluir um diagnóstico, precisa-se de um teste muito sensível, ou seja, que tenha poucos falsos negativos, como, por exemplo, a combinação de questionário sobre comportamento de risco e o teste de HIV feito em amostra de doadores de sangue.
- (B) Quando se quer confirmar um diagnóstico, escolhe-se um teste muito específico, pois ele terá poucos falsos positivos, como, por exemplo, a realização de uma colonoscopia em um paciente com exame positivo de sangue oculto nas fezes, para confirmar se ele realmente tem neoplasia de cólon.
- (C) Em um programa de rastreamento, partindo de uma população de baixa prevalência de doentes, geralmente, utiliza-se um primeiro exame sensível e, em seguida, parte-se para um exame específico, como, por exemplo, a realização da mamografia que, se positiva, deve ser confirmada por biópsia antes de se estabelecer um tratamento.
- (D) Ao reduzir o ponto de corte do exame da glicemia de jejum para diagnóstico do diabetes de 140mg/dL para 126mg/dL, está se aumentando a sensibilidade e a especificidade desse exame no diagnóstico populacional de pessoas assintomáticas.
- (E) Ao se sugerir a um paciente a participação em um programa de rastreamento, deve-se considerar os riscos intrínsecos do exame, de possíveis resultados falsos positivos ou falsos negativos, bem como da complicação de investigações complementares e de tratamentos desnecessários que podem ser sugeridos diante de um exame falso positivo.

29. Gestante de 15 semanas comparece à consulta de pré-natal para mostrar exames de primeiro trimestre. A urocultura é positiva para *Escherichia coli* > 100.000 UFC. Assinale a alternativa que apresenta a conduta mais adequada para essa paciente.

- (A) Observar.
- (B) Tratar somente se apresentar sintomas.
- (C) Tratar mesmo se assintomática.
- (D) Repetir exame imediatamente.
- (E) Tratar e iniciar profilaxia.

30. Paciente de 42 anos, feminina, G1P2, comparece à Unidade Básica de Saúde para consulta ginecológica de rotina. Tem história prévia de NIC 1, mas seus últimos 3 exames citopatológicos (CP) com intervalo de 1 ano foram normais. Assinale a alternativa que apresenta como essa paciente poderia ser orientada quanto ao seu acompanhamento preventivo.

- (A) Fazer o CP obrigatoriamente uma vez por ano.
- (B) Fazer o CP obrigatoriamente a cada 6 meses.
- (C) Fazer o CP a cada 3 anos.
- (D) Fazer CP sempre associado à colposcopia.
- (E) Aplicar a vacina contra HPV.

31. Paciente de 40 anos, previamente hígido, em dietoterapia com nutricionista para redução de peso há 3 meses, IMC = 32kg/m², comparece à Unidade Básica de Saúde para mostrar exames de rotina. Apresenta glicemia = 96mg/dL, colesterol total = 182mg/dL, HDL = 28mg/dL e triglicerídios = 690mg/dL. Assinale a alternativa que apresenta a conduta mais adequada a ser tomada.

- (A) Prescrever dieta por 6 meses.
- (B) Prescrever sinvastatina.
- (C) Prescrever fenofibrato.
- (D) Prescrever colestiramina.
- (E) Prescrever ezetimibe.

32. Assinale a alternativa que apresenta os medicamentos que são considerados seguros para uso durante a gestação.

- (A) Amoxicilina, lítio e fenitoína.
- (B) Metildopa, aciclovir e ácido valproico.
- (C) Varfarina, captopril e doxiciclina.
- (D) Fluconazol, insulina e fenobarbital.
- (E) Digoxina, eritromicina e fluoxetina.

33. Assinale a alternativa que apresenta o tratamento mais adequado para o manejo de pacientes com asma intermitente.

- (A) Beta-agonista de curta duração, quando necessário.
- (B) Corticoide inalatório e beta-agonista de curta duração.
- (C) Corticoide inalatório.
- (D) Beta-agonista de longa duração.
- (E) Corticoide oral contínuo.

34. Assinale a alternativa em que a característica apresentada **não** é um dos atributos essenciais da Atenção Primária à Saúde.

- (A) Longitudinalidade.
- (B) Equidade.
- (C) Integralidade.
- (D) Acesso.
- (E) Coordenação do cuidado.

<p>35. Paciente de 23 anos, feminina, evangélica, chega à Unidade Básica de Saúde para realizar revisão ginecológica. Relata que está grávida e solicita, na recepção, ser acompanhada por mulheres durante todo o seu pré-natal. É feito um agendamento e fica combinado com a paciente que seu atendimento sempre será realizado por uma médica e uma enfermeira da equipe. Assinale a alternativa que apresenta o atributo derivado da Atenção Primária à Saúde que está sendo levado em consideração no atendimento dessa paciente.</p> <p>(A) Orientação comunitária. (B) Competência cultural. (C) Integralidade. (D) Orientação familiar. (E) Equidade.</p>	<p>39. Em relação à Síndrome do Túnel do Carpo, analise as assertivas abaixo.</p> <p>I. Na maioria dos casos, o diagnóstico pode ser realizado a partir da história e do exame físico. II. O tratamento inicial envolve o uso de analgésicos. III. Fisioterapia deve ser reservada apenas para os casos com evolução superior a 3 meses.</p> <p>É correto o que se afirma em</p> <p>(A) I, apenas. (B) II, apenas. (C) III, apenas. (D) I e II, apenas. (E) I, II e III.</p>
<p>36. Paciente de 32 anos comparece à Unidade Básica de Saúde por apresentar febre de 39,5°C de início abrupto, cefaleia, mialgia, artralgia, prostração e dor retro-orbitária há 5 dias. Ao exame físico, apresenta-se febril com 40°C, PA = 120x80mmHg, ausculta cardíaca e pulmonar normais e exantema. Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, o diagnóstico mais provável e o tratamento a ser instituído.</p> <p>(A) Dengue – hidratação. (B) Mononucleose – amoxicilina. (C) Varicela – aciclovir. (D) Rubéola – imunoglobulina. (E) Leptospirose – paracetamol.</p>	<p>40. Uma mulher de 39 anos, obesa, busca atendimento Médico por apresentar unha encravada no hálux esquerdo, com evolução de 3 semanas. A paciente apresenta dor intensa para caminhar e o exame físico revela edema, presença de pequena quantidade de pus e a formação de tecido de granulação no canto afetado. Assinale a alternativa que apresenta a melhor conduta nessa situação.</p> <p>(A) Prescrever cefalexina por 10 dias antes de indicar cirurgia. (B) Realizar a ressecção total da unha. (C) Realizar cantoplastia. (D) Prescrever compressas embebidas em fenol a 80% sobre a unha afetada. (E) Prescrever imersões do pé em água morna 3 vezes ao dia por uma semana.</p>
<p>37. Mulher de 48 anos com diagnóstico de artrite reumatoide, em uso crônico de corticoide sistêmico, iniciará tratamento com metotrexate. Trouxe resultado do mantoux = 16mm. Nega tosse, sudorese noturna ou emagrecimento. Raio X de tórax é normal e relata que não tem contato com pessoas doentes por tuberculose. Assinale a alternativa que apresenta a conduta mais adequada para este caso.</p> <p>(A) Observar. (B) Tratar tuberculose. (C) Iniciar quimioprofilaxia para tuberculose. (D) Solicitar anti-HIV para estabelecer conduta. (E) Fazer BCG.</p>	<p>41. Mulher de 49 anos, raça negra, cabeleireira, consulta-se com o Médico de Família e Comunidade, buscando orientação quanto à prevenção da osteoporose, pois a sua mãe recentemente teve fratura de colo do fêmur, aos 69 anos. Revendo o seu prontuário, é possível identificar, na lista de problemas, que a paciente é obesa (IMC = 32kg/m²), sedentária, fumante e diabética. Ela nunca engravidou e a sua última menstruação ocorreu aos 46 anos. Ela nega uso regular de medicamentos, exceto metformina. Com base nisso, assinale a alternativa em que todos os itens sejam fatores de risco para o desenvolvimento de osteoporose nessa paciente.</p> <p>(A) Tabagismo, uso de metformina e raça negra. (B) Tabagismo, sedentarismo e história familiar de fratura de colo do fêmur. (C) Obesidade, diabetes e menopausa precoce. (D) Nuliparidade, sedentarismo e raça negra. (E) Obesidade, tabagismo e uso de metformina.</p>
<p>38. Segundo o Programa Nacional de Suplementação de Ferro, são candidatos à suplementação todos os indivíduos descritos abaixo, exceto um. Assinale a alternativa que o apresenta.</p> <p>(A) Crianças amamentadas ao seio dos 6 aos 18 meses. (B) Crianças não amamentadas dos 4 aos 18 meses. (C) Gestantes a partir da 20ª semana. (D) Mulheres até o 3º mês pós-aborto. (E) Mulheres até o 6º mês pós-parto.</p>	

42. Em relação ao tratamento medicamentoso do tabagismo, analise as proposições abaixo.

- I. Não está indicado o uso de goma de mascar de nicotina para pacientes que usem próteses móveis.
- II. Antecedentes de convulsões contraindicam o uso de bupropiona.
- III. O uso de adesivos transdérmicos de nicotina pode ser iniciado enquanto o paciente ainda estiver fumando, como forma de motivação para o abandono do hábito de fumar.

É correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) I e II, apenas.
- (E) I, II e III.

43. Mulher de 36 anos procura atendimento, na Unidade Básica de Saúde, por atraso menstrual de 3 meses. Ela é obesa e não vinha fazendo uso de método anticoncepcional há 2 anos, desde o nascimento do seu último filho, que ainda amamenta ao seio. Diante do exposto, assinale a alternativa que apresenta a melhor conduta nesse caso.

- (A) Solicitar dosagem de prolactina.
- (B) Solicitar dosagem de LH e FSH.
- (C) Fazer o teste da progesterona.
- (D) Iniciar anticoncepcional oral combinado.
- (E) Solicitar beta-HCG.

44. Adolescente de 15 anos é levado pela mãe para consulta com o Médico de Família e Comunidade por apresentar prurido nos braços há várias semanas. Exceto por história de asma, não há outros problemas de saúde. No exame físico, é possível identificar pele seca e a presença de áreas liquenificadas em ambas as fossas cubitais, estabelecendo o diagnóstico de dermatite atópica. Em relação a esse caso, assinale a alternativa **incorreta**.

- (A) São necessários níveis elevados de IgE sérica para a confirmação do diagnóstico.
- (B) A piora dos sintomas pode estar relacionada a aspectos emocionais do paciente.
- (C) Corticoides tópicos devem ser empregados por curtos períodos.
- (D) O uso de prometazina é uma alternativa como tratamento sistêmico.
- (E) O *Staphylococcus aureus* é o principal agente infectante das lesões de dermatite atópica.

45. Em relação à laqueadura tubária no Brasil, analise as assertivas abaixo.

- I. Deve haver um prazo mínimo de 120 dias entre a manifestação da vontade da paciente e o ato cirúrgico propriamente dito.
- II. A legislação federal não permite a esterilização cirúrgica feminina durante o parto, exceto nos casos de comprovada necessidade, por cesarianas sucessivas anteriores.
- III. A legislação federal impõe, como condição para a realização da esterilização cirúrgica, o registro da expressa manifestação da vontade em documento escrito e firmado, após a informação a respeito dos riscos da cirurgia, possíveis efeitos colaterais, dificuldades de sua reversão e opções de contracepção reversíveis existentes.

É correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) III, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I e III, apenas.
- (E) I, II e III.

46. Lactente de 2 meses de idade é levado pela mãe à Unidade Básica de Saúde para consulta de puericultura. Ao exame físico, percebe-se que os testículos não estão na bolsa escrotal. Assinale a alternativa que apresenta a melhor conduta a ser tomada.

- (A) Observar.
- (B) Encaminhar para cirurgia com urgência.
- (C) Encaminhar para correção cirúrgica com até 1 ano de idade.
- (D) Encaminhar para correção cirúrgica com até 2 anos de idade.
- (E) Prescrever hormônios masculinos.

47. Criança de 6 anos é levada à Unidade Básica de Saúde por ter sofrido uma mordedura do cão da família há poucos minutos. A mordedura foi única, superficial e na altura do ombro direito. Assinale a alternativa que apresenta a melhor conduta nesse momento.

- (A) Sacrificar o animal para evitar novas mordeduras.
- (B) Lavar o ferimento com água e sabão.
- (C) Iniciar esquema profilático com vacina antirrábica.
- (D) Iniciar esquema com soro antirrábico.
- (E) Realizar o desbridamento cirúrgico da lesão.

48. Em relação à anemia, correlacione as colunas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

1. Anemia microcítica.
2. Anemia normocítica.
3. Anemia macrocítica.

- () Anemia das doenças crônicas.
() Anemia por deficiência de vitamina B12.
() Anemia ferropênica.
() Talassemias.
() Anemia das hepatopatias.

- (A) 2/ 3/ 1/ 1/ 3
(B) 1/ 2/ 2/ 3/ 1
(C) 3/ 3/ 1/ 1/ 2
(D) 2/ 1/ 3/ 1/ 2
(E) 1/ 2/ 3/ 2/ 3

49. Em relação ao diabetes, analise as assertivas abaixo.

- I. De acordo com dados do Ministério da Saúde, a prevalência de diabetes na população acima de 40 anos é de 11%.
- II. Os frascos de insulina que não estejam em uso poderão ser mantidos no congelador por até 3 meses.
- III. A retinopatia diabética é a principal forma de cegueira irreversível no Brasil.

É correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
(B) II, apenas.
(C) III, apenas.
(D) I e III, apenas.
(E) I, II e III.

50. Homem de 56 anos, negro, retorna à consulta, após 3 meses, para o controle da hipertensão arterial. Ele vem fazendo uso de hidroclorotiazida 25mg ao dia, iniciado na consulta anterior, quando a sua pressão, após medidas repetidas em vários dias, situava-se em torno de 166/100mmHg. No momento da consulta atual, o paciente encontra-se assintomático e a sua pressão é de 160/98mmHg. Sendo assim, assinale a alternativa que apresenta a melhor conduta a ser tomada nesse caso.

- (A) Manter o mesmo esquema medicamentoso e reforçar a necessidade de atividades físicas regulares e dieta com pouco sal.
(B) Substituir hidroclorotiazida por captopril 25mg de 12 em 12 horas.
(C) Acrescentar propranolol 40mg de 12 em 12 horas.
(D) Acrescentar AAS 100mg ao dia.
(E) Acrescentar uma dose de hidroclorotiazida à noite.

51. Quanto ao tratamento do paciente portador de esquizofrenia, analise as assertivas abaixo.

- I. Todos os fármacos antipsicóticos têm eficácia semelhante tanto no tratamento agudo quanto crônico da doença.
- II. Pode haver variação individual da resposta clínica de acordo com o fármaco e a dose empregada.
- III. Uma das principais causas de ausência de resposta clínica é o baixo nível plasmático dos medicamentos.

É correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
(B) II, apenas.
(C) III, apenas.
(D) I e III, apenas.
(E) I, II e III.

52. Uma mulher de 44 anos solicita ao seu Médico de Família e Comunidade um atestado de saúde, exigência do clube para renovar a sua matrícula anual nas aulas de hidroginástica, que vem realizando regularmente há 2 anos. A paciente encontra-se assintomática e no seu prontuário não há registro de nenhum problema de saúde prévio, exceto tabagismo. Dessa forma, assinale a alternativa que apresenta a melhor conduta frente a essa situação.

- (A) Orientá-la a retornar às aulas de hidroginástica apenas após ter parado de fumar.
(B) Solicitar eletrocardiograma de repouso.
(C) Solicitar teste ergométrico.
(D) Orientar a paciente a suspender as atividades físicas até uma avaliação completa.
(E) Fornecer o atestado baseado na história e no exame clínico da paciente.

53. O Agente Comunitário de Saúde informa ao Médico de Família e Comunidade que um homem de 95 anos foi encontrado morto por familiares, durante a madrugada, em sua residência. Ele vinha sendo acompanhado há vários anos pela Equipe da Estratégia Saúde da Família (ESF) por inúmeros problemas, entre eles, hipertensão arterial e insuficiências cardíaca e renal, mantendo-se, contudo, estável nas últimas semanas. Ao visitar o domicílio, o Médico verifica que não há sinais de violência. Em relação a essa situação, analise as assertivas abaixo.

- I. O atestado de óbito não pode ser preenchido pelo Médico da Estratégia Saúde da Família.
- II. Caso os familiares decidam pela cremação, o atestado de óbito deverá ser assinado por dois médicos.
- III. Como o óbito ocorreu no domicílio, deve ser registrado que a morte ocorreu sem assistência médica.

É correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) I e III, apenas.
- (E) I, II e III.

54. No que concerne à fibromialgia, assinale a alternativa **incorreta**.

- (A) É comum haver um quadro de depressão associado.
- (B) O exame físico não é útil no estabelecimento do diagnóstico.
- (C) A fadiga é uma das principais manifestações.
- (D) O uso de antidepressivos tricíclicos em baixas doses constitui uma boa opção terapêutica.
- (E) A avaliação laboratorial deve incluir hemograma, velocidade de sedimentação globular e função tireoidea.

55. Buscando quantificar os efeitos colaterais do DIU, o Médico de Família e Comunidade desenvolveu uma pesquisa que acompanhou, pelo período de 1 ano, todas as mulheres da sua Unidade Básica de Saúde que usavam métodos anticoncepcionais. Para tanto, utilizou uma ficha específica do Programa de Saúde da Mulher da Unidade e os prontuários das pacientes. Diante do exposto, assinale a alternativa que apresenta o tipo de delineamento dessa pesquisa.

- (A) Pesquisa qualitativa.
- (B) Estudo ecológico.
- (C) Estudo de casos e controles.
- (D) Estudo de coorte.
- (E) Estudo transversal.

56. Uma mulher de 22 anos consulta-se com o Médico de Família e Comunidade por apresentar dor às micções há 7 dias. Nesse período, usou antibióticos por conta própria, sem melhora. O exame físico revela a presença de lesões eritemato-vesiculosas, em cachos, nos genitais – inclusive junto ao meato uretral – e adenopatia na região inguinal bilateralmente, compatível com herpes genital. A paciente informa que nunca apresentou quadro semelhante. A partir desse caso, analise as assertivas abaixo.

- I. A prescrição de aciclovir tópico é pouco efetiva nesse caso.
- II. Deve ser iniciado o tratamento supressivo com valaciclovir nesse momento.
- III. A solicitação dos exames de anti-HIV e VDRL pode ser oferecida à paciente nessa situação.

É correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) I e III, apenas.
- (E) I, II e III.

57. É(São) fundamento(s) da Atenção Básica, de acordo com a *Política Nacional de Atenção Básica* do Ministério da Saúde:

- I. valorizar os profissionais de saúde por meio do estímulo e do acompanhamento constante de sua formação e capacitação.
- II. realizar avaliação e acompanhamento sistemático dos resultados alcançados, como parte do processo de planejamento e programação.
- III. estimular a participação popular e o controle social.

É correto o que se apresenta em

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) I e III, apenas.
- (E) I, II e III.

58. Considerando a suspensão definitiva ou temporária do aleitamento materno, correlacione as colunas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- D. Definitiva.
- T. Temporária.

- () Mãe infectada pelo HIV.
- () Uso de maconha, cocaína ou anfetaminas.
- () Criança portadora de galactosemia.
- () Mãe portadora de HTLV1 e HTLV2.
- () Infecção herpética com vesículas localizadas na pele das mamas.

- (A) D/ T/ T/ T/ T
- (B) T/ T/ T/ D/ T
- (C) D/ D/ T/ T/ D
- (D) D/ T/ D/ D/ T
- (E) T/ D/ D/ T/ D

59. A respeito de dor lombar, é **incorreto** afirmar que

- (A) o tratamento conservador para alívio sintomático está recomendado nos episódios agudos até 12 semanas.
- (B) a determinação de um diagnóstico específico não é importante no estágio inicial do tratamento, já que a maioria dos casos é de dor lombar inespecífica.
- (C) para a maioria dos pacientes, é recomendável longo tempo de repouso no leito.
- (D) os medicamentos devem ser usados por tempo limitado, preferencialmente em intervalos fixos.
- (E) na dor lombar, a recomendação inicial deve ser de compressas frias para dor aguda até 48 horas e de compressas mornas para dor crônica.

60. Paciente de 45 anos, masculino, comparece à Unidade Básica de Saúde com queixa de fraqueza e cansaço físico. Traz exame solicitado em pronto atendimento há 5 dias: Hb = 9,7; Ht = 29%; VCM = 125; RDW = 12%; leucócitos = 6.000; neutrófilos = 55%; eosinófilos = 5%; monócitos = 9%; basófilos = 1%; linfócitos = 30%; plaquetas = 125.000. Presença de neutrófilos hipersegmentados e macro-ovalócitos, sem reticulocitose. São possíveis causas dessas alterações no hemograma as seguintes condições, **exceto** uma. Assinale a alternativa que a apresenta.

- (A) Alcoolismo.
- (B) Deficiência de vitamina B12.
- (C) Anemia falciforme.
- (D) Cirrose.
- (E) Deficiência de ácido fólico.

61. Quanto ao tratamento do tabagismo, analise as proposições abaixo.

- I. A intervenção breve, como alertar o fumante, produz taxas de cessação de 5 a 10% ao ano.
- II. Os pacientes devem parar de fumar para iniciar o uso da bupropiona.
- III. Pode ser utilizada mais de uma forma de reposição de nicotina para aumentar a taxa de sucesso.

É correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) III, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I e III, apenas.
- (E) I, II e III.

62. Correlacione as colunas abaixo, associando o quadro clínico com as causas de olho vermelho e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- 1. Glaucoma agudo.
- 2. Conjuntivite.
- 3. Corpo estranho.
- () Olho intensamente vermelho, dor intensa, visão muito borrada, ausência de secreção, fotofobia e lacrimejamento intensos, midríase irregular e córnea opacificada.
- () Vermelhidão mais próxima às pálpebras, dor leve, visão levemente borrada, secreção abundante, fotofobia e lacrimejamento discretos, pupilas isocóricas e córnea normal.
- () Vermelhidão pericorneana, dor intensa, visão normal, ausência de secreção, fotofobia e lacrimejamento intensos, pupilas isocóricas e córnea normal.

- (A) 3/ 2/ 1
- (B) 1/ 2/ 3
- (C) 1/ 3/ 2
- (D) 2/ 1/ 3
- (E) 3/ 1/ 2

63. Assinale a alternativa **incorreta** no que tange à encoprese.

- (A) Surge entre 3 e 7 anos de idade e é mais comum em meninos.
- (B) A criança é considerada encoprética caso não estabeleça controle da defecação até os 4 anos.
- (C) A forma mais frequente é a primária e de ocorrência diurna.
- (D) Nas famílias com crianças encopréticas, a mãe geralmente é ansiosa ou deprimida.
- (E) Os antidepressivos tricíclicos podem ser eficazes em casos selecionados.

64. Assinale a alternativa correta quanto ao uso do genograma no atendimento em Atenção Primária.

- (A) É um dispositivo de avaliação aprofundada da estrutura das famílias, mas não permite planejamento e intervenção familiar.
- (B) Somente os indivíduos com relação familiar direta ao núcleo familiar devem ser representados no estudo do caso.
- (C) Deve incluir dados relevantes sobre doenças e aspectos de morte de todos os familiares, dispensando descrição de hábitos saudáveis.
- (D) Constitui-se numa forma de coleta e armazenamento de informações sobre a história da família, que não necessita ser atualizada.
- (E) Sua construção parte do indivíduo doente, com vistas a propiciar prevenção, promoção, recuperação e manutenção da saúde.

65. Assinale a alternativa **incorreta** quanto ao tratamento da depressão.

- (A) Não há evidências de que os antidepressivos sejam superiores ao placebo nas depressões leves.
- (B) Não há diferença de eficácia entre as classes de fármacos ou entre fármacos de uma mesma classe.
- (C) A eletroconvulsoterapia é a forma mais rápida e efetiva para tratamento de depressões graves.
- (D) Tratamentos psicológicos específicos são efetivos, com maior evidência, para depressões leves a moderadas.
- (E) Os antidepressivos têm alto potencial para abuso; sua retirada deve ser gradual para evitar sintomas de abstinência.

66. Paciente do sexo masculino, 23 anos, procura atendimento na Unidade Básica de Saúde com queixas de febre alta, cefaleia, prostração, artralgiás, náuseas e vômitos com início há 4 dias. Realizada a prova do laço, esta se mostrou positiva. Diante do exposto, assinale a alternativa que **não** apresenta um sinal característico de quadro de dengue hemorrágica.

- (A) Desconforto respiratório.
- (B) Diminuição repentina da temperatura corpórea.
- (C) Hepatomegalia dolorosa.
- (D) Hipertensão arterial.
- (E) Diminuição da diurese.

67. Acerca da hanseníase, assinale a alternativa correta.

- (A) A hanseníase é uma doença infectocontagiosa, crônica, curável, causada pelo bacilo de Hansen. Esse bacilo é incapaz de infectar um grande número de pessoas (baixa infectividade), mas muitos adoececem (alta patogenicidade).
- (B) Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), é considerado um caso de hanseníase quando o paciente requer tratamento quimioterápico específico e apresenta um ou mais dos seguintes critérios: lesões de pele com alteração de sensibilidade, espessamento de nervo(s) periférico(s) acompanhado de alteração de sensibilidade e baciloscopia positiva para bacilo de Hansen.
- (C) Baciloscopia negativa afasta o diagnóstico de hanseníase.
- (D) O tratamento pode ser com monoterapia ou associação de duas ou mais drogas em casos resistentes. Os medicamentos indicados são a rifampicina, ofloxacina e minociclina.
- (E) Todos os contatos são devem receber 3 doses da vacina BCG. Quando houver a cicatriz da BCG, deve-se considerar como a 1ª dose e, então, aplicar as outras duas.

68. Paciente de 22 anos, sexo feminino e sexualmente ativa, procura posto de saúde para realização de exame preventivo de câncer de colo de útero. Já realizou 2 exames anteriores, ambos normais. No retorno, a paciente apresenta, no laudo citopatológico, a presença de lesão intraepitelial de baixo grau. Diante do exposto, assinale a alternativa que apresenta a conduta preconizada pelo Ministério da Saúde para acompanhamento dessa paciente.

- (A) Encaminhamento para unidade de média complexidade para colposcopia e biópsia.
- (B) Repetição do exame citopatológico em 1 ano.
- (C) Encaminhamento para unidade de média complexidade para exérese da lesão, visto que esta tem natureza maligna.
- (D) Repetição do exame citopatológico em 6 meses.
- (E) Repetição do exame citopatológico em 3 anos, visto que a lesão tem característica benigna e a paciente já apresentava 2 exames anteriores normais.

69. Paciente de 22 anos, sexo feminino e sexualmente ativa, questiona quais são as medidas para evitar o desenvolvimento do câncer de colo uterino. O Médico de Família e Comunidade explica quais são os fatores de risco e as medidas que a paciente pode realizar para prevenção dessa afecção. Assim, assinale a alternativa que **não** apresenta um fator de risco para desenvolvimento de câncer de colo de útero.

- (A) Tabagismo.
- (B) Higiene íntima inadequada.
- (C) Uso prolongado de contraceptivos orais.
- (D) Imunossupressão.
- (E) Início tardio da atividade sexual.

70. Paciente de 51 anos, sexo feminino, procura atendimento no posto de saúde de sua cidade para realização de exames de rotina. Afirma que há mais de 5 anos não procurava atendimento de saúde. Relata ter hábitos de vida sedentários: não cuida da alimentação nem faz exercícios físicos. Divorciada, mantém relações sexuais com parceiro eventual, com uso de preservativos. Nega tabagismo ou etilismo. Nega ter eventos cardiovasculares prévios e desconhece qualquer problema de saúde. Quando questionada sobre a história familiar, relata que um tio materno faleceu de infarto agudo do miocárdio aos 44 anos. Ao exame físico, não apresenta alterações, e sua pressão média é de 134/86mmHg. O Médico de Família e Comunidade conversa com a paciente sobre quais são os cuidados necessários sugeridos pelo Ministério da Saúde para acompanhamento de seu caso. Dessa forma, assinale a alternativa que apresenta a conduta mais indicada para essa paciente.

- (A) Realizar exame citopatológico de colo uterino, solicitar mamografia de rastreamento, glicose de jejum, perfil lipídico, creatinina sérica, eletrocardiograma, microalbuminúria e encorajar a paciente para manter um perfil de vida saudável.
- (B) Realizar mamografia de rastreamento, glicose de jejum, perfil lipídico, creatinina sérica, eletrocardiograma e exames de lesão hepática (TGO, TGP e fosfatase alcalina).
- (C) Realizar mamografia de rastreamento, exame citopatológico de colo uterino e encorajar a paciente para manter um perfil de vida saudável, somente.
- (D) Realizar exame citopatológico de colo uterino, solicitar mamografia de rastreamento, perfil lipídico, hemoglobina glicosilada, glicose de jejum, microalbuminúria, creatinina sérica e encorajar a paciente para manter um perfil de vida saudável.
- (E) Realizar mamografia de rastreamento, perfil lipídico, exames de lesão hepática (TGO, TGP e fosfatase alcalina) e glicose de jejum, somente.

71. A Dermatite Atópica na fase infantil, até os 24 meses de idade, se caracteriza por lesões, principalmente,

- (A) nos pés.
- (B) na área de fraldas.
- (C) nos membros inferiores.
- (D) na face.
- (E) no tórax.

72. Paciente de 55 anos comparece à consulta na Unidade Básica de Saúde para mostrar resultado de mamografia de rotina. Nega história familiar de câncer de mama. Está assintomática. A mamografia é classificada como BIRADS 3. Não possui exames prévios para comparação. Assinale a alternativa que apresenta a melhor conduta a ser tomada nesse caso.

- (A) Solicitar ultrassonografia mamária.
- (B) Repetir mamografia em 1 ano.
- (C) Repetir mamografia em 6 meses.
- (D) Repetir mamografia em 2 anos.
- (E) Encaminhar para biópsia excisional.

73. Sobre o diagnóstico da depressão em Atenção Primária à Saúde, assinale a alternativa **incorreta**.

- (A) Ao realizar um diagnóstico de depressão, é fundamental avaliar o risco de suicídio e fatores associados, como ausência de suporte social ou plano suicida, que indiquem internação psiquiátrica.
- (B) O tratamento deve ser mantido na menor dose de medicação que traga alguma melhora, ainda que persistam sintomas residuais, que, com o tempo, devem desaparecer.
- (C) A avaliação de episódios maníacos ou hipomaníacos prévios sempre deve ser realizada na entrevista de um paciente com sintomas de depressão, para tomar a melhor conduta.
- (D) Na suspeita de um transtorno bipolar, o paciente deve ser avaliado por psiquiatra antes do início da medicação antidepressiva, pois esta medicação pode desencadear episódio maníaco.
- (E) Considerar, na avaliação clínica do paciente com depressão, doenças que podem ser responsáveis pelos sintomas, como o hipotireoidismo e efeitos adversos de outras medicações de uso contínuo.

74. Sobre o tratamento da ansiedade, assinale a alternativa **incorreta**.

- (A) Os betabloqueadores podem auxiliar no controle dos sintomas autonômicos, como palpitações e tremores, e são utilizados em situações de fobia social circunscritas, como antes de apresentações públicas.
- (B) O uso de inibidores de recaptção da serotonina tem como efeitos adversos: dor epigástrica, diminuição da libido, diminuição do apetite e podem, inicialmente, exacerbar a ansiedade, o que pode ser amenizado com o aumento gradual da dose e o uso de benzodiazepínicos nas primeiras 3 a 4 semanas de tratamento.
- (C) Os antidepressivos tricíclicos não devem ser utilizados no tratamento da ansiedade, exceto quando há presença comórbida de depressão, optando-se, nessa situação, pelo uso da clomipramina por possuir maior ação serotoninérgica.
- (D) A buspirona, fármaco que parecia promissor, não se mostrou efetiva em ensaios clínicos randomizados.
- (E) Os benzodiazepínicos possuem rápido início de ação, porém, seu uso prolongado está associado à dependência.

75. Diversos estudos que avaliam os serviços de Atenção Primária, segundo os princípios definidos por Barbara Starfield, têm demonstrado que o acesso aos serviços de Atenção Primária à Saúde (APS) é um dos aspectos pior avaliados, inclusive na Estratégia Saúde da Família (ESF). Dessa forma, assinale a alternativa que apresenta a proposta de melhoria que poderia resultar em um aumento direto da acessibilidade aos serviços de APS.

- (A) A extensão do horário de funcionamento da Unidade de Saúde, pelo menos uma vez por semana, até às 20 horas, facilitando especialmente o atendimento de trabalhadores.
- (B) O fortalecimento da rede de referência e contrarreferência, a partir do desenvolvimento de prontuário eletrônico único, facilitando o contato do Médico da APS com os níveis secundário e terciário do sistema de saúde.
- (C) A utilização de prontuários de família, que permitam que o Médico acesse informações do contexto familiar, facilitando o entendimento do sofrimento do paciente e o manejo de seus problemas.
- (D) O treinamento dos Médicos da APS em uma abordagem integral do paciente, em suas diversas demandas, tanto clínicas como psicossociais, aumentando o número de problemas resolvidos na própria Unidade de Saúde.
- (E) A aplicação de protocolos assistenciais de emergências hospitalares na ESF, que permitam a utilização de exames de alta complexidade sem que o paciente precise ser avaliado e encaminhado pelo Médico da Atenção Primária.

76. Paciente de 22 anos, casada, G1P1, comparece à Unidade Básica de Saúde com queixa de corrimento fétido e dispareunia. Ao exame ginecológico, apresenta leucorreia amarelo-esverdeada, bolhosa e fétida, colo com petéquias, sem dor à mobilização uterina. Assinale a alternativa que apresenta o patógeno possivelmente associado e o tratamento correto a ser realizado neste caso.

- (A) *Gardnerella* – secnidazol.
- (B) *Clamídia* – azitromicina.
- (C) *Candida* – fluconazol.
- (D) *Trichomonas* – metronidazol.
- (E) *Gonococo* – ciprofloxacino.

77. Quanto aos problemas nutricionais na infância no Brasil, analise as assertivas abaixo.

- I. O déficit estatural é melhor que o ponderal como indicador de influências ambientais negativas sobre a saúde da criança.
- II. Com o aumento da obesidade, a anemia por deficiência de ferro deixou de ser um problema de saúde pública.
- III. O excesso de peso como problema de saúde pública tem suplantado o baixo peso para estatura.

É correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) I e III, apenas.
- (E) I, II e III.

78. Recém-nascido de 10 dias de vida é levado pela mãe à consulta na Unidade Básica de Saúde com lesão vegetante, úmida, de cor rosa pálido em região umbilical, sem calor local. Está em bom estado geral, tranquilo e em aleitamento materno exclusivo. Assinale a alternativa que apresenta a melhor conduta a ser tomada.

- (A) Pincelar solução de nitrato de prata.
- (B) Iniciar antibioticoterapia sistêmica.
- (C) Realizar drenagem.
- (D) Recomendar uso de faixa abdominal.
- (E) Recomendar correção cirúrgica aos 5 anos de idade.

79. Lactente de 2 meses de vida é levado à consulta pela mãe por vômitos cíclicos. Ao exame, está em bom estado geral, ativo, tranquilo, com peso adequado. A criança mama exclusivamente ao seio, dorme bem, suas vacinas estão em dia e houve bom ganho de peso desde a última consulta. Assinale a alternativa que apresenta a conduta mais adequada a ser tomada neste caso.

- (A) Observar.
- (B) Realizar pHmetria.
- (C) Prescrever dieta espessa.
- (D) Prescrever cisaprida.
- (E) Prescrever ranitidina.

80. Uma mulher de 54 anos comparece à consulta por ter notado pequena quantidade de sangue vivo ao realizar higiene após evacuação há 3 dias. A paciente ainda queixa-se de dor, especialmente ao evacuar. Ela relata que as suas fezes sempre foram muito ressequidas, mesmo com o uso de laxantes de fenolftaleína, consumido de forma crônica. Desde então, persiste com dor às evacuações. O exame físico revela fissura anal na posição de 6 horas. Em relação ao manejo dessa situação, assinale a alternativa **incorreta**.

- (A) O uso do laxante contendo fenolftaleína deve ser desencorajado.
- (B) O Médico deve realizar toque retal nessa consulta para excluir a presença concomitante de hemorroidas.
- (C) Prescrição de uma dieta rica em fibras e hidratação adequada.
- (D) Prescrição de analgésicos com anestésico tópico.
- (E) Prescrição de uma pomada proctológica contendo corticoide pelo período de 7 dias.